



PrTEVA-FINGOLIMOD

CARTE PATIENTE SPÉCIFIQUE À LA GROSSESSE TEVA-FINGOLIMOD

Ce document a été réalisé par Teva Canada Limitée, et fait parti du plan de minimisation des risques pour Teva-Fingolimod. Ce matériel n'est pas destiné à des fins promotionnelles.

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la notice dans la boîte de votre médicament avant de commencer à prendre le Fingolimod.

Vous pouvez aussi consulter le guide à l'intention des patients et proches aidants fourni par votre professionnel de la santé.

Avant l'initiation du traitement par Teva-Fingolimod

Vous ne devez pas prendre Teva-Fingolimod si :



- vous êtes enceinte, pensez l'être ou prévoyez une grossesse;
- vous êtes en âge de procréer (inclue les adolescentes) et n'utilisez pas de méthode de contraception efficace
- vous êtes en âge de procréer et qu'aucun test de grossesse n'a encore confirmé que vous n'êtes pas enceinte. Ce test s'effectue juste avant le début du traitement par Teva-Fingolimod.

Teva-Fingolimod peut être nocif pour votre bébé à naître. Si vous êtes une femme susceptible de tomber enceinte ou si vous projetez de devenir enceinte, avant que vous commenciez le traitement par Teva-Fingolimod, votre professionnel de la santé :



- vous informera des risques du traitement sur un enfant à naître;
- vous demandera de passer un test de grossesse pour s'assurer que vous n'êtes pas enceinte;
- vous parlera des diverses méthodes de contraception.
- Vous devrez utiliser une méthode de contraception efficace pendant que vous prendrez Teva-Fingolimod et durant les deux mois qui suivront l'arrêt du traitement.

Consultez votre professionnel de la santé pour savoir quelles sont les méthodes de contraception fiables que vous devez suivre.

Pendant le traitement par Teva-Fingolimod




- Vous devez éviter toute grossesse non seulement durant le traitement par Teva-Fingolimod, mais aussi pendant les 2 mois qui suivent son interruption, en raison des risques de lésions auxquels le fœtus pourrait être exposé.
- Consultez votre professionnel de la santé pour savoir quels sont les risques associés au traitement et quelles sont les méthodes de contraception fiables que vous devez suivre pendant le traitement et les 2 mois qui suivent son arrêt.
- Si vous devenez enceinte pendant que vous prenez Teva-Fingolimod, prévenez votre professionnel de la santé sans tarder. Vous pourrez ainsi décider avec lui quelle est la meilleure solution pour vous et votre enfant.
- Vous ne devez pas allaiter pendant votre traitement par Teva-Fingolimod. Teva-Fingolimod peut passer dans le lait maternel et causer des effets secondaires graves chez votre enfant.
- Si vous devenez enceinte pendant le traitement, vous pouvez communiquer avec Teva Canada Limitée au 1-800-268-4127, poste 3.

Votre professionnel de la santé vous encouragera à vous inscrire au Registre de grossesses sous Teva-Fingolimod.

Ce registre a pour objectif de surveiller le devenir des grossesses chez les femmes exposées à Teva-Fingolimod pendant leur grossesse.

Après l'arrêt du traitement par Teva-Fingolimod



- Informez immédiatement votre professionnel de la santé si vous pensez que votre sclérose en plaques s'aggrave après l'arrêt du traitement par Teva-Fingolimod.
- Une méthode de contraception efficace est nécessaire pendant les 2 mois suivant l'arrêt du traitement.

The Teva logo, featuring the word "teva" in a bold, blue, lowercase sans-serif font. The letter "v" is stylized with a green and yellow leaf-like shape integrated into its right side.